

本草求真

本草求真卷八 第一册

下血 血為人身之寶，安可言下。然有血瘀之極，積
疎動走，而為塊，溫之徒以增熱，涼之或以用滯，惟取
疑按書所載，破血下血藥類甚衆，要在審症明，不
則於治方不謬，如症寒兼熱，內結不解，則宜用
以按求桃仁、歸身、丹參、赤芍、以爲之，破取其辛，以散熱
苦以之降，結之意也。痰氣結其，則宜川以珠，後乾漆
以爲之降，取其氣味猛烈，得參、郁、李、沒、藥、黃、三
既除內結，滋其則宜川以丹參、郁、李、沒、藥、黃、三
土紫菀、紫參、貫衆，以爲之，下取其苦，以善降，不令
內儲之意也。寒氣既除，痰滯不化，則宜用以蒲黃
蘇木以爲之，疎取其氣味宜泄，不令滯滯之意也。

結滯... 此藥... 宜用...

本草求真 卷八 下血

至有借食人血以治血則有血竭水蛭可用借其
 鹹味引血下走則有茜草血竭毛枋紫貝廢虫蠶
 甲可取其陰氣備佈可解則有螻蛄蛇可啖借其
 酸澆鹹臭以解則有皂礬五靈脂可入惟苦溫
 而破則又更有劉寄奴等味但劉寄奴自然劉古
 文錢三七血竭沒藥廔虫則於跌什損傷而用蛇
 蛆則於解毒而用丹參則於血瘀神志不安而用
 水蛭蠱虫桃仁則於蓄血而用花蕊石則於金瘡
 血出而用五靈脂益母草蒲黃則於婦人血滯而
 用茜草則於婦人經閉不解而用五枋子則為婦
 人塊積而用斑蝥則為惡毒而用鴆子則為毒
 血瘀胞絡痰氣積聚而用莪朮則為血瘀積痛不
 解而用郁李仁則為下氣行水破血而用乾漆則
 為燒除老血蓄積而用紫貝則為血熱水積而用
 貝殼則為時行不正而用鱉甲則為勞熱骨蒸而
 用紫參則為血痢腫而用黃芩則為脾中血滯而
 用蘇木則為表裡風起而用草薢則為收痰殺

蠶除濕而用生鵝則為通調津液而用也至於
發乾漆三七水燂痲虫蠶虫防蝨九楞子花蕊石
尤為諸劑中下血敗血之最用之須當審四
不可稍有忽畧以致損人元氣於不測中也

三七 音全 山草

三七 崑入肝目兼人心大腸又名山漆時珍曰或云能合金瘡如漆粘物也 甘苦微

寒而溫世人僅知功能止血任痛殊不知痛因血

瘀則痛作血以敷散則血止三七氣味苦溫能於

血分化其血瘀試以諸血之中入以三七則血旋

化為水矣此非紅花紫草類也故凡金刃刀剪所

傷及跌仆杖瘡血出不止嚼爛塗之或為末滲其

血即止則血不衄後尤宜服之且以吐血

血下血血痢崩漏經水不止產後惡露不下俱宜

白嚼或為末米飲送下即愈并虎咬蛇傷血出可

治血此為陽明厥陰血分之藥故能流一切血

病一種庭砌栽植者以苗搗敷腫毒即消亦取散

血之意一種有在苗夏高三四尺葉似菊艾而勁

絲盤紐可剪而氣不香花乾則吐絮如苦蕒絮根

葉味甘治金瘡跌傷出血及上下血病甚效云是

三七而根大如牛勞根與南中來者廣產形如人

不類恐是劉寄奴之病甚易繁微
參者是時珍曰此藥近時出百南人軍有佈非研
中用為金瘡要藥云有奇功

川良

西華言三
蔓草

茜草 歸人心 味酸鹹寒色赤功用畧有似於紫草

但紫草則止大肝涼血使血白為通滯此則能入

肝與心胞使血必為走泄也故凡經閉風痺黃疸

疸有黃疸黃疸酒疸黃汗疸女勞疸皆有寒濕熱

濕之別此則專就蓄血以論大抵寒濕宜用茵陳

附子內障以透熱濕宜用梔子 因於瘀血內阻者

大黃血瘀宜用桃仁承氣之類 服之固能使瘀下行如值吐崩尿血因於血滯而

見艱澀不快者服之更能逐瘀血止總皆除瘀去

入心胞
肝行血

血之品與於紫草血熱則涼之意貌同實異不可
混也但血虛發熱者忌用根可染絳忌鍊

紫參

言命
山草

紫參肅人肝兼入胃味苦而辛氣寒無毒功肅人

肝逐瘀破血兼入胃腑膀胱使血自為通利故凡

寒熱血痢癰腫積塊心腹積聚因於血瘀阻滯而

成者無不可以調治以其味苦則泄味辛入肝寒

則勝熱而使血從二便出矣仲景治下痢腹痛而

用紫參湯以除亦取散其積血之意

聖惠方治吐
血不止用紫

參人參阿膠炒等分為末烏梅湯服一錢一方去
酒刺用紫參丹參人參苦參沙參各
一兩為末胡桃仁杵和為丸茶下
但市人字識
其真川以紫莖為代唯其寒熱不同而其疎利則

一及藜蘆古方治婦人腸單病烏味

金音金
李金芳草

替金端入辛苦而平諸善論斷不一有言此橋純
陰其論所治皆橋破氣下血之說有言性溫不寒
其論所治則有療寒除冷之謂究之體輕氣窳其
氣先上行而微下達凡有宿血凝積及有惡血不

堪之物先於上處而行其氣若使其邪其氣其痰

其血在於膈上而難消者須審宜溫宜涼同於他

味兼為調治之震亨曰胃火與上其性輕

脈逆行並宜符金未加若汁當汁常尿同服其血

自清痰中帶血者加竹瀝又鼻血上行者符金非

物服之如敗血衝心加以薑汁童便去心瘋癩明

禁為丸硃砂為衣與受熱毒加以升麻之類釋方治

失心癲狂用真博金七兩明禁三兩為末薄柳九

白湯下又婦人願狂十年至人校此初服心胸劇

有物脫去神氣滿然再服而過此驚憂痰血結聚

心竅所致符金入心去惡血明攀化頑痰故也又

范石湖文集云嶺南有桃生之害於飲食中行厭

勝法魚肉能反生於人腹中而人以死則除投其

寒則得覺脘腹痛次日刺人十日則生在腹中也
 凡胸膈痛即川升麻或膽礬吐之若膈下痛即以
 米湯調碎金末二錢服即瀉出惡物或合升麻
 湯金服之不吐則下若使惡血惡痰
 惡痰惡淋惡痔在於下部而難消者俟其辛氣既
 散苦氣下行即為疎泄而無滯澀難留之弊矣此
 藥木屬入心散瘀傷寒論云研瘕始有白洩忽搗
 藥二錢半水半杯黃芩六廿草切片焙研末入冰
 片五分每用一錢以生豬血五七滴新汲水下
 因瘀去而金得泄故命其名曰鬱金書云此藥純
 陰而寒者因性主下而言也有云是藥性溫而言
 者因氣味辛香主上而言也各有論說不周以致

水部求真 卷八下 五

理難畫一耳因為辨論正之出川廣園如蟬肚外
黃內赤色鮮微香帶甘者真市人多以薑黃偽充

莪朮

詳矣
方草

莪朮

入肝

辛苦氣溫大破肝經氣分之血蓋人血

氣安和則氣與血通血與氣附一有所偏非氣盛

而血碍即血壅而氣滯三稜氣味苦平既於肝經

血分逐氣莪朮氣味辛溫復於氣分逐血故凡氣

因血窒而見積痛不解吐酸并豚疝癰癥瘕等症

者須當用此調治

按之應手為癥是因傷食所得
假物也形為瘕是因傷血所得

傷肝氣
分之血

見於肌膚可見為癩是四傷氣所傳結於隱靜不
 見為癩是因積聚所得五積肝積曰肥氣在左臍
 下形如覆杯有頭有足如魚鱗狀心積曰伏梁起
 於臍上大如手臂上至心下脾積曰痞氣在胃脘
 透大如盤肺積曰息疰在右脅下覆如人背腎積
 曰奔豚發於少腹上至心下如豚奔走之象或上
 或下亦無定時經曰大積大聚毒可犯也其其大
 半而過者死故去積須以甘溫調養又曰壯者
 無積惟虛人則有之故養正則邪自除 仰氣自
 血而凝而不致閉結不解矣但蓬朮雖始磨積之
 味血積宜用梲仁山甲乾漆大黃葶虫蓬朮瓦礮
 下廣積宜用牛黃白朮枳實礮石硝石風
 化硝白芥子海蛤始粉木積宜用大戟甘遂芫花
 葶苈酒積宜用乾葛神曲砂仁豆蔻黃連乾薑甘
 遂牛膝茶積宜用薤白黃芩黃柏蘼蘼積宜用三稜
 莪木巴霜大黃肉積宜用山楂阿膠硝石礬積宜

本草求真 卷八 下血 莪朮

用雄黃錫灰槌碎雷丸燕莢使君子鶴虱疝積宜川桃仁紫甲草葉若虛人服之最

補可危須得參朮補助為妙大者為廣朮物極堅

硬雞搗灰火煨透乘熱搗之或醋磨酒磨或煑熟用

薑黃言全芳草

薑黃人味辛而苦氣溫色黃功用頗類鬱金苦

赤三稜苦平皮白延胡索色黑延胡索色辛鬱金色黃

心專瀉心包之血莪朮入肝治氣中之血三稜入

肝治血中之氣延胡索則於心肝血分行氣氣分

行血此則入脾既治氣中之血復兼血中之氣耳

陳藏器曰此藥辛少苦多藏器曰性性氣過於醇

金破血立通下無最速凡一切結氣積氣癥瘕痰

血血閉癰疽並皆有效以其氣血兼理耳時珍曰

痺湯用片子薑黃治風寒濕氣手足臂痛或原禮要

訣云片子薑黃能入手足臂治痛其兼理血中之氣

可知若血虛腹痛臂痛而非瘀血凝滯者用之反劇

蜀川產者色黃質嫩有鬚折之中空有眼切之分

為兩片者為片子薑黃和濟方治胎寒腹痛啼哭

出冷汗鮮黃一錢沒藥二錢乳香二錢為末蜜丸

黃黃一兩桂三兩為廣生者質粗形扁如乾薑僅

厚生

本草求真卷八 赤白血 七

可染色不可入藥服之有損無益

蒲黃

音火
水草

蒲黃入味甘氣平功用無他但以生用熟用炒

黑分其治法耳以生而論則凡瘀血停滯腫毒積

塊跌仆傷損風腫癰瘰溺閉不解服之立能宣泄

解除時珍曰一婦舌脹滿口以蒲黃頻塗比曉乃

愈宋度宗舌腫滿口御醫用蒲黃乾薑末等

分探之愈視此則蒲黃之涼血可知矣蓋舌為心

前心包相火乃其臣使得乾薑是陰陽相濟也失

笑敬用此同五靈以熟焦黑則凡吐血下血腸風

生用
煎通
煎止

脂治血氣滯痛

血尿血痢服之立能止血然此止屬外因可建奇

功若內傷不足之川，則非此所能治者矣。

川參 三見九

丹參 補人心包 味苦色赤性平而降 時珍曰五色配五臟

故人參入肝曰黃參沙參入肺曰白參玄參入腎

日黑參入命門葉也古人採

紫參而稱苦參未達此義 書載能入心包絡破

瘀一語已盡丹參功效矣然有論其可以生新安

胎調經除煩養神定志及一切風痺崩帶癥瘕目

赤疝痛瘡疥腫痛等症 時珍曰按婦人明理論云

前流後經水多少皆可通用惟一味丹參散主治
與之相同蓋丹參能破宿血補新血安生胎落死

破心腹 血瘀 神志 因物湯 亦宜 不復

用
耳
法
同

入
心
池

胎止崩中帶下調經脈其功大
類當歸地黃芩芍藥故也
總皆由其瘀去以

見病無不除非真能以生新安胎養神定志也凡

妊娠無故大便不實者切忌畏鹽水忌醋反藜蘆

益母草 苦辛

益母草 一名茺蔚辛微苦寒功能入肝心

胞絡消水行血去瘀生新調經解毒為胎前胎後

要劑是以無胎而見血淋血閉血崩帶下血痛下

者因病生於帶脈之意也帶脈橫於腰間凡病人

下自則為白帶屬氣虛宜補中益氣下赤則為赤

帶屬血虛宜養血既胎而見胎漏臨產而見難產

滋陰而兼調氣

已產而見血暈疔腫乳癰等症服此皆能去瘀生

新時珍曰益母草根莖花葉實並香人藥若治用

消經風熱明目益精調經則用于治腫毒常傷

因根莖花葉專於行血而于則行中有補也蓋味

辛則於風可散血可活味苦則於瘀可消結可除

加以氣寒則於熱可凝並能隨症酌施則於母自

有益耳外此皆沙腹瀉嘔之用此濃煎恣飲亦取

能散惡血若其病非惡然氣味辛散痛去散大者

其切忌之益母子至治畧同但行中有補非若益

本草求真 卷八下 血益母草

六日採取良濟陰返魂丹六月六日採花葉實為

膏忌鍊子微炒用

劉寄奴濕草

劉寄奴肝因何而有是名據書載是劉裕小字

寄奴曾射一蛇目見童子搗藥問之答為寄奴所

傷被谿罵而收藥每遇金瘡敷之即愈故以寄奴

是名但此雖非屬真而藥味苦微溫多能破瘀通

經除癥下脹及止金瘡血出大小便血湯火傷毒

緣血之在人身木貴通活滯而不行則血益滯而

不出而癥瘕脹滿愈甚行而不止則血亦滯而不收而使血出益甚寄奴總為破血之品故能使滯者破而即通而通者破而即收也。扶盡破血古書止言治功而不詳釋其義殊覺疎漏但性多走泄不可過服令人吐利不止莖葉花子皆可用

蘇木 蘇木 蘇木

蘇木 出人 甘鹹辛涼功用有類紅花少用則能和血多用則能破血但紅花性微溫和此則性微寒涼也故凡病因表裡風起而致血滯不行暨產後

本草成法 卷八 下血劉寄奴蘇木

血暈脹滿以死及血痛血癥經閉氣壅癰腫跌撲損傷等症皆宜相症合以他藥調治如疎賦則與防風同用行血則與乳香同用薛藥但性平疎泄產後惡露已盡大便不實者均應禁用出蘇方交

愛交州忌鍊

沒藥香木

沒藥入心苦平兼辛諸書亦載能補心膽與肝

蒸訓瘀血不除則無血安生乳香氣味辛溫既能行氣活血又有沒藥之苦以破其瘀則推陳致新

八心能
血氣
止痛

自有補益之妙

宗師曰：沒藥大能通滯血，血滯則氣壅，氣壅則經絡滯，急經絡

滯急故痛，且腫。凡打撲跌傷，皆傷經絡，氣血不行，瘀壅作腫痛也。

是以古方乳香

必同沒藥兼施

生肌散每用相兼而用

謂其可止疼痛，義由

此也。今人不明藥品氣味，動以書載補益，豈不誤

甚。出南香色赤類琥珀者，良治同乳香。

郁李仁

言齒
灌木

郁李

射人脾兼入膀胱大腸

世人多合胡麻同用，以為潤燥

通便之劑。然胡麻功止潤燥，煖中活血，非若郁仁

性潤，其味辛甘，與苦而能入脾下氣，行水破血之

劑也故凡水腫癰急便閉開格不通得此體潤則

滑味辛則散味苦則降與胡麻實異而又可以相

需為用者也按宋史錢乙傳云一乳婦因悸而病

之因唯即愈所以然者日張不得照乙日黃郁李酒飲

能順矣此蓋得然此止屬治標之劑多服恐滲液

而益燥結不解耳去皮尖蜜浸所

乾漆音奈

乾漆音奈入味辛氣溫有毒以景曰生漆毒烈人以

嗜也有降無升崩破日久凝結之血及削年深堅

結之積緣人感受風寒暑濕鬱而為病。則中不舒。胃中有物留滯不消。久而生虫。血積不化。結而為瘀。由是陽氣竭。澤津液枯。槁難瘳。風痺。因之不免。用此辛溫毒烈之性。鏟除瘀積。中氣得復。絕傷皆。藥而緩急和矣。按血見漆化水。故能化盡破血。千金三蠱方皆賴以之為君。震亨曰。漆性急而飛。用之中節。積滯去後。補性內行人不知也。本經言能輕身者。以其蠱去而身自輕之謂也。所謂中氣可復。絕傷可續者。亦因瘀去而虫自復。與傷血續之謂也。但無積血者。切忌以其大。

傷營血損胃氣耳炒令烟盡為度

試漆訣云微扇光如鏡懸係色

似物城成琥珀若患漆瘡以生蟹汁紫蘇解之

色打著有屑唯志云漆得蟹而成水蓋物性相制也
凡人畏漆者嚼蜀椒塗口鼻則可免

血竭

音奕香木

血竭樹入係南嶺樹木之液猶人之膏脂者是味

甘而鹹性平色赤按五味惟甘主補鹹主消血竭

味甘雖能和血收口止痛生肌然味鹹則消却能

引膿性肅入肝經血分破瘀故凡跌仆損傷氣血

攪刺內傷血聚並宜同酒調服通氣乳香沒藥雖

一治漆瘡

主血病而亦兼入氣分此則備大血分而不兼及
 氣分者也但性最急迫引膿甚利不可多服解的比
 血竊無積瘀者不必用之以藥透指中燒灰不變
 色者佳藥肆偽造甚多有用松香同煎藥成有以海桐乳真者絕
 少同衆藥搗川則作飛塵得密陀僧夏

桃仁 五葉

桃仁備人心胞肝 辛苦甘溫為厥陰心胞肝血分主藥
 夫血者陰也有形者此周流乎一身一有凝滯則
 為癥瘕瘀血血閉或婦人月水不通或跌撲損傷

積血及心下宿血堅痛皆從足厥陰受病以其為

藏血之臟也苦能泄滯辛能散結甘溫通行而緩

肝故並主之。所以為畜血必備之藥。成無已曰肝

聚則肝氣燥肝若急急食甘以緩之。桃仁之甘以

緩肝以散血故張仲景抵當湯川之以治傷寒八

九日內有蓄血發熱如狂小腹滿痛小便自利者

又有當汗失汗熱毒深入吐血及血結肝煩燥諸

語者亦以此湯下之與且桃為五木之精能鎮辟

不祥故主辟邪味苦而辛故能殺小蟲雖云苦能

去滯甘能生新但苦重甘微氣薄味厚沉而下降

故瀉多補少散而不收用之不當及過用多用使

血下不止。損傷真陰。不可不慎。張璠曰。大抵氣血

症不能流。溫則消而去之。此軒岐密旨。但世之各

於醫者。一見血症。即以寒涼濟陰。為務。其始非不

應手而取效。於一時屢發屢折。而既病之虛。陽愈

衰。必致嘔逆喘乏。奪食泄瀉。尚以藥力未達。猶進

苦寒。有陰不濟陽。而上溢者。尚為戈戟。况陽不統

陰。而亡脫者。尤為鴆鴆。益因陽藥性暴。精有不順

下咽。立見其害。不若陰柔之性。至死不知其誤。而

免旁人之譏。訪也。噫。醫之弊。儘可為知已道。難為

俗人行。血連皮尖。生用潤燥。去皮尖炒。用俱研碎

或燒存性。用雙仁者。有毒。不可食。香附為使。能誅日

丹石毒。生者尤損人。瑞曰。棟與

蓮藕言九入

水藕

人心解
血枯
發熱

蓮藕入出瘀泥而不染其根通達諸竅聯綿諸

絡尤為交搆黃宮通調津液之上品味甘性寒入

心脾血分冷而不泄澀而不滯故凡產後血積煩

悶酒後煩渴藕升麻盛怒血凝藕以灰髮二錢痛脈

藕亂虛渴失血血痢並金瘡折傷酒毒蠶毒熱痛

誠一切精熱癩瘡服之立為解除若非熱非瘡以

其有破血止熱之力也煮熱甘溫益胃補心實腸

久服令人心懽并搗塗折裂凍瘡熱搗塗並洗目

產後忌生冷獨藕不忌謂其能散瘀血也散字作

不作表。噤口痢服能止結糞自下。胃氣自開者亦散言。噤口痢服能止結糞自下。胃氣自開者亦以熱除血解而言。冷痢噤口者忌服。熱服止瀉實腸者以

其有溫補之力也。益脾補心者以其味甘入胃多

孔象心之謂也。時珍曰：藕生於卑汚而潔，白者

時珍曰：藕生於卑汚而潔，白者

時珍曰：藕生於卑汚而潔，白者

時珍曰：藕生於卑汚而潔，白者

時珍曰：藕生於卑汚而潔，白者

以豆麥菱粉偽充。真者絕少。藕節味澆。同生地汁煎便善止一切吐衄血。赤忌鉄。相感志云：藕以鹽水供食則不損口。

同煎煉類本草食
則無滄羨忌候歸

自然銅 言先金

自然銅 崑入 因何川能接骨蓋綠骨被折傷則血

瘀而作痛得此幸以散瘀破氣則痛止而傷自和

也。而骨安有不接乎。且性乘堅剛於骨頗類故能

入骨而接。是以有合乳香沒藥磁石五銖古錢麻

皮灰血竭胎骨作丸煎膏歸地黃續斷牛膝丹皮

紅花濃湯送下以治跌撲損傷最效但病即已

不可過服以致真氣走泄耳。震亨曰自然銅世以爲接骨之藥然此等

痛 世 驗 類

經方

方傳後大抵宜補氣補血補胃倍工惟在速效通合病人之意而銅非煨不可用若產後

血虛者忌服產銅坑中火煨醋淬七次細研新出

其火毒金毒相煨挾香藥熱毒雖有接骨之功燥散之屬甚於刀劍甘草水飛用

古文錢四百金

古文錢出人氣味辛涼雖曰屬銅有毒然歷久氣

化其毒無多時珍曰古文錢但得五考其主治有

曰能治目赤翳障婦人生產橫逆者是能閉其血

氣壅塞之路也宗真曰予少時常患赤目腫痛數

淨去皮以古青銅錢刮汁點之初甚苦熱淚度面然終無損後有患者教之往往疑惑信士點之無

不一點迷愈更不須再但作瘰者不可川也有曰能治心腹痛者是能
散其血氣凝結之意也。有曰能治月解不來者是
能解其胞脈也。有曰能治五淋者是能通其衝任
熱壅也。有曰能治跌撲損傷者。火煨醋拌是能入
其受傷凝滯之所而消其血瘀也。故治曰赤黥障
則須用以生薑汁塗刮青點目生肉障生花不用
治婦人逆產五淋則須煮汁以服治便毒初起則
與胡桃肉同嚼食二三枚即消。以金伐木者故耳
或煮湯或刮青或醋服各依本方製用

乳蕤石 四百一

花蕤石 端人 雖產疏黃山中號為性溫然其味酸

而滿其氣亦平故有化血之功其是以損傷諸血

胎產惡血血運並子死腹中胞衣不下服之體即

疏通瘀血化為黃水金瘡血流敷即合口誠奇方

也 頌曰近世以合硯黃同煨研末敷金瘡其效如

效 但此原病劫藥其功專於止血能飲血化為水

酸以收之也 東垣所謂胞衣不出滿劑可下後止

後須以獨參湯救補則得之矣若使過服則於肌

通止

血有損不可不謹以錐固濟頂火煨過出火毒研
細水飛晒乾用

皂礬 四百三

皂礬 謂入解燕入 等於白礬味亦酸鹹而滑有收

痰除濕去蠱殺虫之功但力差於白礬而稍緩耳

且此色綠味酸燒之則赤用以破血分之積垢其

效甚速如金匱之治女勞黑痺硝石礬石丸專取

皂礬以破積瘀之血且治喉痺用此以取酸漏化

涎之力 同米醋研食 惡瘡疥癬用以收燥濕解毒

長安陸
續中成
垣分利
垢

之功腸風瀉血用此以收消散濕熱之後又有收
 瀘之功也然而諸治之外又善消積滯凡腹中堅
 積諸藥不能化者以紅礬同健脾胃消食藥為丸投
 之輒消按張三丰仙傳云治脾土衰弱肝木氣盛
 木丸方用蒼朮二觔米泔水浸同黃酒麴麴四兩
 炒赤色皂礬一觔醋拌晒乾火煨為末醋糊丸每
 服三四十九好酒米湯下日三服時珍但胃弱人
 常以此加平胃散治賊役中腹滿果驗不宜多用服此者終身忌食蕎麥犯之立斃青黛
 淨者瓦煨赤用畏醋

五靈脂

四百三
原角

入肝行
血榮
止痛

五靈嗜心肝即比地寒號虫鳥矢也

時珍曰鳥乃候時之鳥

也五莖諸山甚多其狀如小鷄四足有兩翅夏月

毛采五色自鳴若日風風不如我至冬毛落如鳥

號怨寒而號曰得過日過其矢植巢一處氣甚腥

惡粒大如豆揉之有如糊者有枯塊如糝者人亦

以砂石雜而貨之凡用以其愛五行之靈其矢狀

如凝脂故有五靈脂之號其氣腥臭難聞其味苦

酸而辛惟其腥穢難聞故能入血凝臭穢之處而

療其病惟其味苦酸而辛故能入心與肝而泄其

滯是以心中血氣刺痛婦人產後少腹兒枕塊痛

及痰挾血成窠囊血凝作痛目翳往來不定等症

皆為血分行氣必需之藥宗爽曰有人病目中所病
 也肝受血則能視目病不治血為片理也川五醫
 脂之藥而愈又有入破盤毒所傷長久昏憤僧以
 酒調藥二錢灌之遂甦仍以梓敷咬處少頃復潛
 二錢其若去問之乃五靈脂也兩雄黃半兩同
 為末耳又李仲甫云五靈脂治崩中非止治血之
 藥乃去風之劑風動物也衝任經虛治風傷氣營
 血以致崩中暴下與荆芥防風治崩義同方悟古
 人識見深遠如此此亦一說但未及肝血虛滯亦
 自生風之意按衝為血海任為胞胎任脈通衝
 肝盛則月事以時下無崩漏之患且易生子若
 女中血崩經水過多赤帶不止宜半炒半生酒調
 服之亦治氣遊癩瘡及解虫毒藥毒但此氣味俱
 厚辛燥不堪綱目指為甘溫張氏謂非正論改為

性寒。不為無見。故僅可治有餘之滯。若使氣血不足。服之。大損真氣。腥更使人動吐。所當避也。酒飛

去。砂石晒乾入藥。行血宜生。止血宜炒。惡人參。

九楞子 四言四

九楞子 崩人 卽今所謂蚶子殼者是也。味鹹而甘。

性平。故治多至消血。化痰除積。為婦人血塊癥瘕。

男子痰癖積聚要藥。 積者陰氣也。五臟所生。其始

下有肝終始。左右有所窮處。謂之積。聚者陽氣也。

六腑所成。其始發無根本。上下無所留。其痛無

常處。謂之聚。積聚之症。非止根於偶爾。食積不化

之。可用以化氣消導之劑。誅經有言。卒然飽食。多

飲則腸滿起居不節用力過勞則絡脈傷傷於陽
 絡則血外溢血外溢則血傷於陰絡則血內溢
 血內溢則後血傷於腸胃之絡則血溢於腸外腸
 外有寒汁沫與血相搏則并合凝聚不得散而積
 成矣且以胃之大絡名曰虛里貫膈絡肺出於左
 乳之下其動應衣是即陽明宗氣所出之道凡人
 飲食不節漸以留滯而致痛積成是以前人有云
 於左脅膈膜之外者皆此候也
 此與驚甲蟲同為一類皆能消瘿除積但蠹虫
 其性最迅此與驚甲其性稍緩耳煨紅醋淬三次
 用

斑蝥

四百五
卵生

斑蝥入

最屬惡物聞人捕捉即於尾尾射出毒

氣令人臭不可聞近人肌肉則潰入胎則墜其毒

概可知矣神農本草經云春食芫花為芫青夏食

破惡氣

中為地膽按芫青青綠花九毒亭長其味辛其氣
寒其性下走而不上專走下竅血至精潤之故書

言外用止可以蝕死肌敷疥癬惡瘡內治止可以

破石淋拔療癰疔腫下大傷惡毒而已取其以毒

攻毒也然惟實者可用其拔療癰毒則以班蝥法

製使令毒根從便出如粉片血塊爛肉之形楊登

爛瘡之毒莫不有根大抵治以班蝥地膽為三制
度如法能令其根從小便出如粉片血塊爛肉

次以木通滑石燈心草并導之但下犬毒之初先
於患人頭上拔去血髮二三莖以斑蝥七枚去粗
足炙黃用蟾蜍搗汁服之瘡口於無風處搨去惡
血小便洗淨髮炙敷之服後小便常有瘀毒泄出
三四日當有狗肉三四十枚爲盡如數少再服七
枚若愈後忌聞鐘聲復發則不可治矣去頭足穢
米炒熟生用則吐瀉人亦有用米取氣不取質者
畏巴豆丹參惡甘草芫花

水蛭

四百六
卵生

水蛭入即馬黃蚘生於陰濕之處善食人血味

鹹與苦氣平有毒與蝨虫功用相似通利水道破

血墮胎致月閉血痕積聚無子並腫毒惡瘡折傷

皆能有效然煨之存性見水復能化生噉人臟腑

破瘀之藥甚多何須用此如犯之者止用黃泥作

丸吞之必入泥而出以土制水故也時珍曰昔有

食水菜誤吞水蛭入腹生子為害噉嘔腸血腸痛

黃瘦者惟以田泥或插黃土飲數升則必盡下出

也蓋蛭在人腹凡用須預先熬黑七日置水中不

活者方用畏石灰食鹽柯琴曰水蛭水物陰於食

血由蟲飛物猛於食血

五虫化生

蘇虫崙人微苦微鹹氣寒有毒善啗牛馬猪血因

其性以為用故以之治一切血結諸病故凡病血

蓄而見身黃服結腹痛如狂小便利並墜瘕積塊

瘰癧丸竅閉塞者服之自克有效以苦泄結鹹走

血故也且色青入肝服之宜入肝臟血分而散之

矣河間云蘇食血而治仲景合水蛭用此以治大

陽蓄血如狂亦是此意但性燥惡毒以此治病是

由刑罰之治盜賊非得已也去翅足炒用惡麻黃

胎

本草求真 卷八 下血 蘇虫 三二二

應虫

四百八
化生

腐虫

肝 入

即腐地驚又名土驚者是也味鹹性寒

其物生於土中伏而不出善攻隙穴以刀斷之中

有汁如漿鬪接即連復能行走故書載跌撲損傷

續筋接骨義由此耳真奇物也且人陰血貫於周

身雖賴陽和亦忌燥烈若熱氣內鬱則陰陽阻隔

而經絡不通因而寒熱煩生得此鹹寒入血軟堅

則凡血聚積塊癥瘕靡不因是而除而血脈調和

營衛暢達凡事時至又安有血枯血閉而不見其

原身
續筋
接骨

腐虫

生育者乎故又能治諸般血症而使挾孕而有子
 也是以古人用此以治跌撲損傷則多合自然創
 龍骨血蝸乳香沒藥五銖錢黃荆子麻皮灰狗頭
 骨以治下腹痛血痛血閉則合桃仁大黃以治
張仲景治雜病方及久病積結有大黃蠶屎丸又
有大驚甲丸及婦人藥並川之以其有破壁下血
 之功各隨病症所因而用之耳陰乾臨時研入畏身
 英蒿蒲屋遊

螃蟹

四九

螃蟹

入胃肝

最屬陰寒故書所述利弊大令人駭如

除血
血毒
五毒

解與柿同食則令人泄瀉及發癥瘕與孕婦食則

能使胎即下謂曰孕婦食之令子橫生而爪尤甚以蟹燒烟則

能集鼠於庭弘景日以黑犬血灌蟹三日然之諸鼠畢至同銀硃燒烟

則能使臭虫即斃蟹近於漆則能化漆為水筋骨

損斷用蟹搗爛微炒納入瘡中則能使筋即連他

如胸中熱結膈辟面腫及蓄血發黃婦人乳癰硬

腫小兒顛解凡因熱結熱滯而成者無不用之立

效其化血為水逐熱消痰未有若是其神者矣括

筆談云關中無蟹土人收乾者懸門上辟瘧不但人不識鬼亦不識也總緣性屬鹹

寒外骨內生青熱赤陽包陰象陰氣純佈故克
見其迅利耳若血因寒滯及腹中疼痛喜熱惡寒
者其切忌焉醜巽宜入蒜投則不沙蔽中巽毒者
宜搗藟節熱酒調服宗奭曰此物極動風風疾人不可食屢見其事

本草求真卷第八 第一册終

本草求真卷八 第二册

雜劑 殺蠱 發蠱 解毒 毒物

殺蠱 病不外乎虛實寒熱治不越乎攻補表裡所
亦不越乎一理以為貫通又安有雜治雜劑之謂
哉惟是虛實異形寒熱異致或內滯不消而為
薄疑鬼疰外結不散而為癰疽瘰癧在蠱既有虛
實之殊寒熱之辨而毒亦自有表裏之異升降之別
此蠱之所必經而毒之所以必治也至於治病用
藥尤須審其氣味冲和合於人身氣血相宜為貴
若使卒苦燥烈用不審顧禍必旋踵諱於雜劑之
中又將惡毒之品另為編賦俾人一覽而知庶於

本草求真卷八第二册
雜劑 殺蠱 發蠱 解毒 毒物

本草求真 卷八 雜劑 殺蠱 發蠱 解毒 毒物

本草義疏或已得其過半云。又按蠱之生本於人
 之正氣虧損而成。體實者其蠱本不易生。即生亦
 易殄滅。體虛者其蠱乘空內蓄。蓄則即為致害。害
 則非易治療。考之方書所載治蠱藥品甚多。治亦
 錯雜不一。如黃連苦參黑芷牛扁菴蒿是除濕熱以
 殺蠱也。大黃朴硝是除熱邪以殺蠱也。雷丸蘆薈蛇蛻是除
 熱積以殺蠱也。葛根是除時行熱毒以殺蠱也。青
 箱子是除肝經風熱以殺蠱也。故其為藥皆寒而
 不溫。梲耳子松脂蜜作僧見除風濕以殺蠱也。故
 其為藥稍溫而不涼。川椒椒目是除寒濕水濕以
 殺蠱也。故其為藥溫燥而不平。蘇合香雄黃阿膠
 樟腦蛇退是除不正惡氣以殺蠱也。故其為藥最
 辛最溫。水銀硃輕粉鉛粉黃丹大楓子山茵陳
 五倍子百草煎是除虐毒以殺蠱也。故其為藥寒
 熱皆有。紫貝排仁乾漆皂莢百草霜見除血瘀以
 殺蠱也。故其藥亦多寒熱不一。厚朴槲榔見除濕
 滯毒氣以殺蠱也。故其為藥苦溫而平。穀出鶴虱

使君是除痰食積滯以殺蟲也故其為藥又甜而
 又寒。獼肝是補用腎之虛以殺蟲也故其藥味鹹
 而氣溫。至於根實則能潤肺以殺蟲。烏枚則能
 肺以殺蟲。百部則能清肺散熱以殺蟲。皆有不是
 寒燥之虞。且蟲得酸則止。凡烏枚五倍子等藥非
 是最酸之味。以止其蟲乎。得苦則下。凡大黃黃連
 苦練根。蘆薈。苦參。非是至苦之味。以下其蟲乎。得
 辛則伏。凡川椒。雄黃。乾漆。大楓子。阿魏。輕粉。樟腦
 檳榔。非是最辛之味。以伏其蟲乎。得甘則動。凡用
 毒蠱之藥。必加甘蜜。為使。非是用以至甘之味。以
 引其蟲乎。至於寒極生蠱。可用菹附以殺蟲。出
 上出。可用藜蘆。上涌。以為殺熱閉而蟲不下。可用
 羌花。黑丑。牛黃。以為殺食。蝕齒。可用胡桐。派黃。紫
 非子。蟾酥。以為殺食。蝕皮。而為風。毒。可用川
 權皮。海桐皮。以為殺九輪。陰蝕之蟲。可用青箱子
 西益。葉。以為殺疥。瘡之蟲。可用收鼓。心。桃。符。板
 虎。糞。骨。死。人。枕。獼。瓜。鴨。骨。以為殺。但。用。多。梘。率
 苦。酸。酒。惟。使。君。推。實。治。蠱。按。書。備。以。甘。取。義。實。有

本草求真 卷八 雜考 殺蟲 二六

在。自非補於醫道者
所可與之同語也。

鶴虱 四音子

鶴虱 肝 入 氣味苦平。 即杜牛膝子 功專入肝除逆。故凡

一身痰凝氣滯。得此苦以疎泄。則痰氣頓解。而出

自無安身之地矣。况虫得苦則伏。如小兒蚘疳腹

痛。用以鶴虱研末。納於肥肉汁中。投服。其蟲自正

蟲痛。而白唇。非其蠱。因苦逐。得克存是。但藥肆每

以葫蘆。葫子代充。不可不辨。 千金方曰。人腹生虫。大率有九。一曰伏虫。

長四分。為羣虫之主。二曰蚘虫。長一尺。生發多。則

貫心而殺人。三曰白虫。即寸虫。長一寸。子孫相生。

入肝除
痰凝滯
殺蟲

其母轉大長至四五丈亦能殺人四日內虫狀如
鬮查令人煩滿五日肺虫狀如繭令人咳嗽六日
胃虫狀如蝦蟇令人嘔吐胃逆喜噦七日弱虫又
名鬮中狀如瓜漚令人多睡八日赤虫狀如生肉
令人長鳴九日虺虫形極微細有如菜虫居於廣
腸之間多則為疔剛則為瘰因人瘡痰即生癰疽
癰癩癩疥癩
虫無所不為

雷

丸雷丸

雷丸雷丸味甘而鹹性寒小毒本竹餘氣所結得

霹靂而生故有雷丸之號功端入胃除熱消積化

蟲故凡濕熱內鬱癰疔狂走汗出惡風蠱積殆甚

腹大氣脹蠱作人聲者服之即能有效蠱在肝令人恐怖眼

除邪
損邪

一 綠 佩 齋

中赤熱熱在心，命及心，則發熱在脾，使人勞熱，四肢腫急，在肺使人咳嗽氣喘，以其秉性純陰，兼味至苦，感其禪靈，故能去其邪魅也。所云

惟利男子不利婦人，亦以婦人屬陰，故於陰物不

宜耳。志曰：久服令人陰痿。充之果屬腎熱，亦又何碍，但無盪

積不得妄用。皮黑肉白者良，若肉紫黑者殺人。甘

草水浸一宿，酒拌蒸，或泡用厚朴、羌活為使，惡葛

根。補按：綱目述揚勛腹有小聲，應人後讀至本

蘆朮 香木

蘆蒼 崑入肝，狼入脾，心 大苦大寒，功專殺蟲除疰

卽波斯國木

安心明目最為小兒驚疳疳積上品唐初使君子
 飲且能吹鼻殺腦疳及除鼻癢劉禹錫傳信方云
 在額頭間後延上左耳遂成濕瘡少年會患面初
命積毒其瘡轉甚偶於桂州賣藥人移用諸藥徒
兩疾甘草末半兩研末先以溫漿水然苦雖能殺
洗癬伏巾傳之立乾便瘥真奇方也
蟲寒能療熱而氣甚穢惡臭則逆所當慎投
 施之藥獲若胃虛少食人得之入口便大吐逆遂
 致奪食世馮因而羸瘦怯弱者多矣如黑錫味苦
 色綠者真

阿魏

醫上
香木

本草代元 卷八 藥性論 阿魏 二八

入脾胃
燥除
燥除

阿魏附入出西番波斯國中阿虞木枝極汁味辛
 氣平而溫且極臭烈故書載能殺蟲辟惡又其味
 既兼辛與溫則氣更活不滯故書載治瘡辟穢是
 以濕瘡鬼魅癩疥傳屍惡氣疔積等症服之最為
 得宜王隱百一選方治久瘡川真他人血氣因香
 則順遇臭則逆故習虛氣弱之人雖有瘡積但當
 溫胃和氣俾瘡自消切勿用此臭烈以傷胃氣至
 辨真偽則但取少許安置銅器一宿油處白如銀
 色者真以真最難得古人已有黃琴無假阿魏

無真之說矣用鉢和研熱酒器上燂過入藥

大楓子 木 四

大楓子 木 屬毒藥耳按據諸書皆載味辛性

熱其藥止可取油以殺瘡疥若用此以治大風病

則先傷血而失明矣 故以 故凡血燥之病宜用

黃寒以勝縱有瘡疥宜辛宜熱而血有受損不更

使病益劇乎即或效以驟成功以劫致然烈毒之

性不可多服惟用外敷不入內治其功或不沒也

凡入丸藥湯藥俱宜除油為妙

性 虫

樞實

四十五
夷菜

樞實諸入

甘滑微苦澀潤而滑性平無毒按據諸

書有言氣味苦寒能瀉濕熱為肺家之菜又云性

溫散氣能去腹中邪氣及殺諸蠱皆無定論余按

樞實甘潤是其本質凡肺不潤而燥者得此則宜

故有解燥除熱之功非書所云能除濕熱之意乎

又其燥熱內擾則虫肉疳見他而五疳腹脹等症

自爾悉形服此燥氣悉除腸胃頓清其氣自爾不

結非書所謂澀能散氣之意乎又書有載有毒無

樞實
好在水

樞實

毒在人食既無病。又能以此療病。毒何由見。非嘗
 所云無毒之說乎。又其苦澆兼脩。既能清燥潤肺。
 復於蠱蝕性味不合。令其即化為水。非嘗所云有
 毒之說乎。究之止腐潤肺。解熱殺蠱之品。其言有
 毒。止是毒虫之毒。而非毒人之毒也。其言無毒。因
 非毒人之毒。而為毒虫之毒也。故凡一切肺燥。而
 見咳嗽不寧。腹中不和。五疳惡毒。並小兒黃瘦。便
 秘不解等症。服之無不奏效。好食茶葉。面黃。每日
食樞子七枚。以愈為
 度。治寸白蟲。日食樞子七枚。滿七日。虫皆化為水。背東坡詩云。驅除三彭

盤愈我心腹疾義正是矣但多食則有滑腸之虛

炒食味即香酥甘美更有引火入肺大腸受傷之

慮不可不細察耳忌鴨肉反菘豆能殺人物類和成志云

樞灸素靈味更甜美猪脂炒極黑皮自脫極子同甘蔗食其渣自軟

水銀

水銀走而不守從石中迸出者為石汞從丹砂中出者

為硃裡汞究皆丹砂液也性稟至陰辛寒有毒質

重著而流利得鹽礬為輕粉加硫黃為銀硃煬成

鍊同硫黃打火昇煉則為靈砂同皂礬則為升降

新中

蠶丹藥之飛騰靈變無有過是故以之殺諸虫疥

瘡也然至陰之性近於男子陰器則必消痿無氣

入耳能蝕人腦至盡頭瘡以入肉令百節癢癩外

敷尚防其毒之害內服為害不待言而可知矣今

有水銀燒成丹砂人得聚肉入嚼同研則散得

鉛則凝得硫黃則結時珍曰水銀陰毒之物無似

言其久服成仙此種言其還丹元母抱朴子以為

長生之藥六朝以下貪生者服食至成廢篤而喪

厥藥不知若下人矣方士固不足道本草其可妄

也同黑鉛結砂同鎮壁又知同硃黃結砂則其救

本草長生 卷八 殺毒水銀 三十一

要得紫河車即伏得川椒則收水銀失在地者以花椒茶木收之

銀硃醫七

銀硃治外係水銀同煨煉成硃性燥味辛方書用以

殺蟲治瘡亦是以毒解毒而已用以食服古人切

戒謂其性悍烈良非所宜時珍曰功過與輕粉同且同蟹殼

燒之則臭虫絕跡和棗肉熏之則瘡疥頓枯於此

可徵其概矣

輕粉醫六

輕粉治骨係水銀加鹽礬昇煉而成水銀一兩白

銀粉
白銀

一商人鑄器內益覆封固升鍊又法水銀一兩
 七錢白鹽五錢同上昇法一兩未可升粉八錢
 按水銀金之魂魄鍊銀鉄之精華二氣雖是化純
 同根是以煉製成物無鹽則色不自氣雖是化純
 陰而為辛燥然陰毒之性猶存故能殺虫治疥
 瘡消積烈毒之性走而不守今人用治楊梅瘡毒
 雖能燥風痰濕熱從牙齦而出暫得寬解銀粉
 能傷牙齒蓋上下齒眼梅手足陽明之經毒氣感
 於陽明而精神氣血水穀既不勝其毒則毒即循
 經上行而至齒然毒氣竄入筋骨血液耗損欠欠
 根嫩薄之分然毒氣竄入筋骨血液耗損欠欠
 猴為結毒遂成廢人仍須用水銀昇鍊入三白丹
 引拔毒之藥同氣搜逐癘風醉仙丹通天再造散

本草求真 卷八 雜考 銀粉 輕粉

三二

用以搜剔毒邪仍從齒縫而出再以錢氏利驚丸

白餅子並川取痰積從大便而出矣

時珍曰黃連

熱解可畏磁石石黃一切血

本出於丹砂故也

制其毒用輕粉滑石杏仁去皮尖等分為末蒸過入腦磨

少許以鷄子清調勻名太真紅玉

穀虫如紅玉

穀虫腸胃味苦性寒出於糞中故仍取其入腹消

積俾其不傷正氣也其法漂淨炙黃為末調服又

用蝦蟇數十隻打死置於罈內取穀虫入內食盡

然後淘除穢惡取穀虫焙乾凡小兒疳積腹大脚
弱膜遮積及大人熱結譫語毒利作嘔並宜服
之無不立效是以鼻齒疳瘡取此有尾者燒灰一
錢同褐炭灰和勻類吹最效與利骨取米用白馬
腦上肉壘成劬待生蛆與烏骨白鷄一隻食之取
糞陰乾每一錢入鹽砂一錢研勻用少許擦瘡處
疳時即落皆取穢以入穢遇骨與肉鑽入之意無
他義也

本草求真卷第八 第二册終

本草求真卷八 三肺

活熱解毒其內陰虛者宜用桂枝湯
以熱藥散寒

痰毒內經曰營氣不從逆於肉裡乃生癰腫又曰
因陰陽相滯而生則是癰疽之發固合內外皆致
而不僅於肉裡所見已也但其毒氣未深等於傷
寒邪初在表其藥止宜升發而不遽用苦寒俾其
毒從外發若稍入內為歿則毒勢離綿不已而有
毒氣攻心必死之候矣予按發毒之藥品類甚多
凡三陽升發藥葛葉防白芷別芥薄荷桔梗等藥
何一不為發毒之方至於蜈蚣則能祛風通瘀散結
為驅毒之方辟惡野菊花則能散火透氣王不
蛇退則能驅風直滯皆為祛散毒之劑外有蟾
諸行則能行氣直滯皆為祛散毒之劑外有蟾

本草求真 卷八 發毒

三四

本草求真

之勞
益利

胞衣不出用此研膏以塗脚心即下中風口眼喎
 斜偏左貼石手心偏右貼左手心即止至於口噤
 鼻塞耳聾喚痺舌脹用油煙蒸即開水擦淨腫用
 仁研服一枚即消凡人止針刺好肉用仁搗敷患
 處即接癰癤惡瘡用仁外敷立愈時珍曰鶴鵝油能引藥氣入內
能麻油能接病氣出外凡此皆屬外用以奏奇功但不宜於
 服耳昔人有以汁點齋舌根下即不能食點齋肝
 門內即下血死非云服葶藶者一生不得服豈犯
 即脹死非毒可知隨水煮去皮研取油用忌鉄

本草求真 卷八 癰毒腫毒 三五

芙蓉花

四三
澤木

芙蓉花出入川為外科癰疽藥也凡清涼膏清露

散銀籬散即是此物蓋此味辛氣平質滑功治清

肺涼血散熱止痛消腫排膿比一切癰疽腫毒無

論花葉及根皆可搗研為末調密塗四圍留中患

處乾則頻換初起者即覺清涼痛止腫消已成者

即膿出已潰者即易斂或加赤小豆荖耳子同人

為末功效殊見然必毒輕不重川此方可若大毒

陰毒其勢莫甚則非輕小平劑所能治矣此又不

此物

可不知也

楓香

置三香木

楓香

脂入肝脾

係楓膏脂所成結而為香故曰楓香又

曰白膠香按楓性鼓疎通故木易蛀外科用以透

毒金瘡末收即效筋斷即續齒頰腫痛燒灰揩牙

甚正咳唾膿血同藥服之即止皆取透發病氣之

意時珍曰楓香松脂皆可亂乳香其功雖次於乳香而亦勞罷不違故能見其皆

治也以蘇水煮二十沸入冷水中揉扯數十次晒

乾用

本草求真 卷八 蘇香 蘇香 蘇香

三六

續圖

象牙 獸齒

象牙 齒入 味甘性寒按象性至剛猛而牙則舊脫

故凡皮肉間有形滯物及邪魅驚悸風癩並惡瘡

內有毒未拔者服之立能拔效以其具有脫性故

能以脫引脫耳 時珍曰時人知燃犀可見水怪是以

癰腫不解用牙磨水服之并剉末蜜調塗之即效

諸鐵竹木刺入肉剉煎湯溫服即愈諸骨鯁入

於喉刮下薄片類服即吐再服以吐出為度

象皮味鹹氣溫專治金瘡不合用皮煨灰存性敷

發

服 援外

之亦可焚膏入散

蟾酥

四生

蟾酥

入肉

即蟾蜍

俗名蠪蝦蟆

眉間內有白汁者是也

味辛氣溫有毒能拔一切風火熱毒之邪使之外

出蓋邪氣着人肌肉鬱而不解則或見為疥腫發

背陰瘡陰似疽癘惡瘡故必用此辛溫以治蓋辛

溫散溫至行使邪盡從汗發不留內入而熱自可

以除矣但性有毒止可外治取效

如發背未成者用活蟾蜍紫菀

上牛目蟾必昏慎置水中救其命再易一個三易則毒散矣勢重者剖蟾蜍合瘡上不久必臭不可

問再易二三次即愈。即或用丸劑亦止二三四粒。慎勿以微物見輕也。

而已多則能使毒入。其用作丸投服亦宜雜他藥。

內入如牛黃明礬乳香沒藥之類毋單服也。故書。

一載挾諸毒。只宜用酥一錢白麵二錢硃砂少許作。

錠諒病輕重酌與不可盡服。又治背發無名等毒。

取酥三五分廣膠木化米醋入銚火化乘熱手刷。

不已以散為度刻玉塗之等於刻蠟房術用之更。

善總皆外科奪命之功。括一旬輕用爛人肌肉至若。

蟬蛻氣味辛寒。凡癥瘕積塊風犬咬傷小兒疳積。

成內

瘟疫發斑瘡疽發背用之與酥罌同以其辛有發
 散之能然有逐熱之功外敷則見神功內服除去
 頭足腹腸垢亦能去積除熱如風狗咬傷用蟾蜍
 後尾搗汁生食先於患人頂心拔去血髮三四莖
 於小便內見沫其毒即解發背初腫用活蟾數個
 更易繫於腫上法詳則毒其亦散矣唐珍曰蟾蜍
應月魄而性靈異穴土食虫又伏山精制蜈蚣故
能入陽明經退虛熱行濕氣而為疔病癰疽諸瘡
要藥也 總皆具有外拔內攻之力勿輕用也蟾酥以
 油單紙裹屑裂之酥出紙上陰乾用蟾蜍焙乾去

皮瓜酒浸去肉用

人牙

四百五十五

人

入牙

崙大

味鹹性温功崙治痘倒靨綠痘或出不

快及見黑陷多因毒氣深入故須用此內發時珍

曰齒者腎之標骨之餘也痘疹則毒自腎出方長

之餘外為風寒穢氣所冒腠理閉塞血流不行毒

不能出或變黑倒靨宜用此物以酒磨達之窺入

腎經發出毒氣使熱令復行而瘡自紅活蓋劫劑

也若伏毒在心昏胃不省人事及氣虛色白脾塌

食性
寒熱

不能作膿熱癰紫泡之症止宜解毒補虛苟誤用

此則憐固聲啞反成不瘳可不慎哉

高武癰疹管見云左仲恕

既歸腎矣人牙豈能復治之乎煨退火毒用

本草求真卷第八

三九

録圖

本草求真卷第八 第三四終

本草求真卷八 第四冊

活無州府是黃絲醫生

監生馬廷賢

已而宮林對閱

解毒 毒雖見症於外而勢已傳於內則藥又當從
 內清解毒亦為治毒之方所不可缺也
 毒人便知金銀花牛膝子等為解毒之品凡屬
 毒劑無不樂投詎知毒因心熱而成者則有黃連
 連翹可解因於肺大而或者則有黃芩可解因於
 肝火而成者則有膽草黃蘗藍子可解因於胃火
 胃毒而成者則有白芍芍藥大黃可解因於腎火
 而成者則有黃芩知母可解且毒在於腸胃症見
 蘇痘乳間宜用漏蘆以通之症見消渴不止宜用
 絲豆漿汁以飲之症見腹痛宜用金汁大黃對以
 所之症見時行惡毒宜用金汁大黃對以利之至
 於楊梅疔疔疔疔疔疔疔疔疔疔疔疔疔疔疔疔疔

喉痺咽痛多屬痰火厥結直刺射干以開之心
 火熾宜用山慈根以煨之與瘰癧瘰癧瘰癧
 筋絡及脾毒根宜用蛇蚶以化之口眼喎斜瘰
 癧瘰癧多屬經絡宜用蝮蛇以化之口眼喎斜瘰
 癧乳岩多屬肝胃結毒宜用蒲公英以化之惡瘡
 不飲多屬心脾肝胃結毒宜用貝母以除之無名
 惡瘡瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧瘰
 癧瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧
 以治之毒勢急迫咳嗽不止多屬中氣虛損宜用
 黃芩以緩之他如癰腫不消有用米醋同藥以治
 熱腫不除積垢不清有用皂白二畧以入癰疽不
 腫胸熱不除有用甘草節以投皆有深意內存不
 可稍忽若在班整以仙子靈壽之尚要當審症酌
 治不可一毫措
 忽於其中也

牛蒡子

胃云
濕草

牛蒡子

肺 入

又名惡實又名鼠粘子辛苦冷滑今

紅世

清加

人止言解毒凡遇瘡瘍腫痘疹等症無不用此
 投治然尤未釋其義此人毒氣之精多緣外感風
 寒營氣不從逆於內裡故生癰毒牛蒡味辛且苦
 既能降氣下行復能散風除熱探得表裡是以感
 受風邪熱而見面目浮腫咳嗽痰壅咽喉腫痛瘡
 瘍斑疹及一切臭毒癰閉痘瘡紫黑使閉等症無
 不藉此表解裡清但性冷滑利多服則中氣有損
 且更令表益虛矣至於脾虛泄瀉為尤忌焉實如
 葡萄而褐色酒拌蒸待有霜拭去用

金銀花

蔓草

金銀花

入肺

經冬不凋故又名忍冬味甘性寒

毒諸書皆言補虛養血又言入肺散熱能治惡瘡

腸癖癰疽痔漏為外科治毒通行要劑按此似屬

而岐疔不知書言能補虛者因其芳香味甘性雖

入內逐熱而氣不甚迅利傷損之意也書言能養

血者因其毒精血凝服此毒氣頓解而血自爾克

養之謂也究之止屬清熱解毒之品耳

確

是以一

切癰疽等病無不藉此內入取其氣寒解熱力主

清熱

通利至云能治五種屍症事亦不虛飛屍遺屍風

五症病因不一但此專主風濕內結為熱而言又

按精要云恐冬酒云治一切癰疽腫貧藥材難得

須用慈冬條生取一把以葉入砂盆研爛入生餅

子酒少許稀稠得所至於四圍中留一口破氣其

條止用五兩木樨搥損不可也教大甘草節生用

一兩同人沙瓶內以水二盆文武火慢煎至一

人無灰好酒一大器再煎十數沸去渣分為三服

一日一夜喫盡病勢重者一日二劑服至大小腸

藥力到如謂久服輕身延年益壽不無過謬凡古

人表著藥功類多如是但在用藥者審認明確不

誤為藥治效所感也花與藥同功其花尤妙江浙

以此代茶

山荳根

蔓草

山荳根

入

大苦大寒功能瀉心保肺及降陰經

火逆解咽喉腫痛第一要藥綠少陰之脈上循咽

喉咽喉雖處肺上而肺逼近於心故凡咽喉腫痛

多因心火挾其相火炎熾以致逼近不寧耳治當

用此以降上逆之邪俾火自上達下而心氣因爾

以除且能以祛大腸風熱

肺與大腸相表裡肺氣清則大腸風熱亦解

及解藥毒殺小蟲并腹脹喘滿熱厥心痛逆則心

腹皆

煎療人馬急黃

熱去

磨汁以飲五疔諸瘡服

清心降火

之悉平、總賴苦以泄熱、寒以勝熱、耳、但脾胃虛寒、
作瀉者、禁用。

薺菜 山草

薺菜 肺入 即甜桔梗、似人參而體虛、無心、似桔梗

而味甘不苦、按據諸書、有因味甘、較能和中、止嗽

消渴、然力專主解毒、以毒性急、迨甘以和之、故也、

觀葛洪肘後方云、一藥而解眾毒者、唯薺菜汁、饑

飲一升、或煮嚼之、亦可作散服、此藥在諸藥中毒

皆自解也、又張騫胡野合載云、名醫言、虎中藥、箭

食清泥而解野猪中藥筒歷薺危而食物猶知解

青何况於人乎觀此洵為解毒之最且更能治

中精出消渴之後發為癰疽之症千金有薺危丸

亦以取其清熱解毒之功無他效耳薺危丸用薺

磁石括髮根熟地黃地骨皮玄參石斛鹿茸各一

兩人參沉香各半兩為末以猪肚治淨煮爛并和

五石心磁湯下猪腎薺危湯用猪腎一具薺危

根其心者兩人參茯苓磁石知母葛根黃芩括萎

大豆取汁一斗夫津下藥再煮三升分三服後人

者其性即不可不察但市肆多取此苗以亂人參又有取此

媽薺危

白頭翁 山草

晉李

白頭翁 入腸胃 味苦性寒何書用此以治痢便膿血

經云腎欲堅急食苦以堅之痢則下焦虛損故以

純苦之劑以堅如仲景之治挾熱下痢之用白頭

翁湯之屬是也 湯用白頭翁黃連 若使熱結不除則

腎愈虛愈解而痢莫愈又書何以用此以治溫瘧

寒熱齒痛骨痛鼻衄赤瘡疔瘻等症亦因邪結腸

明服此熱解毒清則腎不燥接而骨同齒屬胃不

受邪而齒安 陽明毒不上渡而衄止熱不內結而

本草綱目卷之八 新加坡 四四

疳與瘕皆却疳用此風無熱熾而小兒頭禿得除矣總皆清解熱毒之力也近根有白茸得酒良

漏蘆 習三 濕草

漏蘆 味甘 人味苦而鹹氣寒有毒凡苦則下泄鹹則

軟堅寒則勝熱漏蘆氣味俱備其性端入助明胃

經故凡癰疽背癢乳汁不通及預解時行痘毒者

咸須仗此以解毒邪俾邪盡從便出而解矣 諸症非盡

熱毒而起不得妄用然書又云遺精尿血能止亦因毒解熱

除自止之意非因漏蘆尚有收瀉之力也但氣虛

漏蘆

疥癬不起及孕婦有病者切忌出園中莖如油麻
枯黑如漆者真甘草并連翹為使

山慈姑

山竹

山慈姑

山人

味苦微辛氣寒微毒功消濕熱消結

解毒故凡症患癰疽無名疔腫癰疹惡瘡蛇虺齒

傷癩癰結核等症用此外敷

醋磨

固可解散內服

亦可調治癰為結毒散結之方

昔在流粉律向
山慈姑夜掌

洗但性寒涼不可過服根與慈慈小蒜相類去毛

鼓用

紫豆 醫三

紫豆 勝胃味甘氣寒據書脩極利善有言能厚腸

胃潤皮膚和五臟及資脾胃按此雖用參耆歸朮

不是過也第書所言能厚能潤能和能資者緣因

得邪內熾其臟腑經絡皮膚脾胃無一不受毒擾

服此性善解毒故凡一切癰腫等症無不用此奏

效 非鮮一切草木金石頑難等藥煮汁則止消渴磨粉合以乳香

丹砂則能護心使毒不入 護心膏築枕夜臥則能

明目疎風杖瘡疼痛則用鷄子白調敷即愈皮膚猶

醫三

疑國齋

疑國齋

疑國齋

涼於菜豆退翳明目如神粉撲痘潰尤妙一市民
經甚誠出行折一尼真叫菩薩麥僧授一方菜豆
粉新餅炒紫胡非水調厚敷患助杉木北定其效
如皆有除熱解毒之功而無補益滋助之力且與
撰子相反同食則殺人

蚯蚓醫書

蚯蚓人服最屬寒味觀書所載甚明其言味鹹

性寒無毒其論所治則云能主伏蛇鬼疔傷寒伏

熱狂謬熱病發狂血熱癩疥多紫黑癩瘰黃疽

損傷垂危瘰癧潰爛流串腎風脚氣倫極熱痔瘡

解毒

本草求真 卷八 新補藥 五 四

症皆能調治

宗與曰腎臟風下注病不可關也須日脚氣藥必須此物為使然亦有

有人因勝劑藥中用此果得奇效病愈服之不暇

至二十餘日原情但欲飲水不已遂至頭委大抵

攻劑用青藥中則其氣味之爽不待言矣究其所

病即當止也

以致治則因此物伏處密處以鑽士飲泉是其本

性故能除其鬼疰解其伏熱且味鹹至下處濕而

以入濕為功故於濕熱之病濕熱之物遇之即化

停癥膏水觸着即消而使點從小便而出時珍曰其性寒

而下行故能解諸熱疾下行且利小便治風痰而通經絡也知蜎木有鑽士之

能化血之力而凡跌仆受傷血瘀經絡又安有任

其候蓄而不爲之消化乎但審認不爾妄爲投用

良非所宜取老蜥蝥白頭者良搗汁井水調下入

藥成晒乾爲末注昂云中共毒者鹽水煎之張鶴

煎鹽水洗身或微炙或燒灰各隨本方用

蝸牛濕生

蝸牛大腸入經絡即帶殼大蜒蚰是也生下濕地陰

雨即出性稟至陰味鹹小毒故古方用此以治真

陰虧損肢理不密致風中於經絡而見口眼喎斜

筋脈掣拘及風熱脫肛痔瘡腫疔發背疔腫

本草求真 卷之六 毒物類 蝸牛

等症皆能見效總曰入總以取其鹹寒解其諸

熱之性耳并解蜈蚣毒取形尖小綠桑木佳無殺色

人中黃 胃氣

人中黃備入是用甘草末入於竹筒塞孔冬月置

於糞缸之內經春取出懸相風處陰乾取用味甘

性寒書載功備入胃解毒以其味甘故也甘入其

解五臟實熱以其氣寒故也寒勝又治濕疫諸毒

班狂及發瘡癩黑陷不起以其臭與不正相類故

能以毒攻毒也然遇急難得可取坑垢以代卷終

本草求真卷八 第五册

毒物凡藥冲淡和平不寒不熱則非毒矣。即或乘
 亦非毒矣。至於陰寒之極。燥烈之甚。有失冲淡和
 平之氣者。則皆為毒。然毒有可法製以療人病。則
 藥雖毒而不得以毒稱。若至氣味燥烈。並或純陰
 無陽。強為制伏。不敢重投者。則其為毒最大。而不
 可以妄用矣。如砒。硫。礞。砂。巴。豆。鳳。仙。子。草。烏。射。罔
 鉤。吻。是熱毒之殺人者也。草。蘇。阿。膠。水。銀。鉛。粉。木。鱉。菊。蕩。是
 寒毒之殺人者也。草。蘇。阿。膠。水。銀。鉛。粉。木。鱉。菊。蕩。是
 非冲和。獨有辛毒之氣。而亦能以殺人者也。然補
 竊謂醫之治病。凡屬毒物。固勿妄投。即其性非毒
 烈。而審症不真。新服不實。則其為毒最大。而不可

信然其宜其無差

醫者其宜

是道法按字

以救矣况毒人之藥人所共知人向知禁若屬非
毒視為有益每不及防故余痛見人病常有朝服
無毒之藥而夕見其即斃者職是
故也因附記以為妄用藥劑一戒

鳳仙子豎毛毒草

鳳仙子俗入又名急性是俗所謂金鳳花子是也

其性急猛異常味苦氣溫小毒凡人病患頑痰積

塊噎膈骨哽服之立刻見效以其氣味急迫能於

骨穴堅硬處所極力搜治是以勝金丹用之以治

任癰取其急能破毒吐泄同砥以點牙疼即落同

獨蒜搗汁以塗瘡塊即消臨食不下用鳳仙花子酒浸三宿晒乾為末酒

攻堅
破積

九葉豆大每服八粒溫酒加麝香阿魏尤捷投于下不可多用卽急性子也以煮硬肉卽爛但此生不出蟲蜂蝶不近且多食則戟人喉似非無毒川之當細審量可耳

巴豆

附片大喬木

巴豆附片大性熱大毒據書所載生猛熟緩可升可降能行能止開竅宣滯去膿瀰沉寒爲斬關奪命之將大旣能宣滯通竅則藥能降能行何書又言能升能止耶此數字不無令人少疑究之書之所言降者因有沉寒痼冷積聚於臍深入不毛故欲

法藏
沈宗
大德

四九

去不能去不得其無辛熱迅利斬關直入掃除
陰翳推陳致新亦安能蕩滌而如斯哉是即膏之
所謂能降能行者耳。至有久病瀉泄服升提瀉藥
而瀉反甚脈滑而沉是明脾胃久傷冷積凝氣所
致法當用以熱下則寒去利止而脈始得上升是
即所謂能升能止者是也。時珍曰一婦年六十餘
瀉泄五載犯生冷油膩
肉食即作痢服升瀉藥瀉反甚脈沉而滑此乃脾
胃久傷積冷疑滯法當以熱下之用蠟厝巴豆丸
五十粒服一二日不利而愈白
是每用治泄痢愈者近百人耳夫醫理玄遠變化
靡盡在人引伸觸類母為書執則用藥不岐即如

大黃亦屬通閉開便之品。然惟肺病多熱者最宜。若以臟病多寒。而用大黃通利。不亦自相悖謬乎。故仲景治傷寒傳裡多熱者。多用大黃。東垣治五積屬腸者。多用巴豆。與大黃同服。反不瀉。人曰。該用有推墻倒壁之虞。蓋用有勘亂調中之妙。元素曰。世以治酒病膈氣。而以巴豆辛熱通開。腸胃熱結。巴豆煎火。芽鬱結難通。血液隨亡。其陰虛損。傷寒結胸膈。小兒疳積。用之不死。亦危。藥何處。人畏大黃而不畏巴豆。以其性熱劑小耳。試以少許。輕擦皮膚。須臾發泡。况下腸。豈能無瀉。灼蒸爛。

之患乎即有急症不得已而用之

解毒丸雄黃一兩附金一錢巴豆十四粒去皮油

為丸每五五分注咽下雄黃破結氣附金破惡氣

巴豆下開涎然係用劑不可輕用或用紙捻中吐

豆油燃火刺喉或搗巴豆綿裹隨左右納鼻中吐

出惡涎紫 壓去其油取霜少許入藥可也

小者為此有稜及兩頭尖者是雄雄者則峻耳用

之得宜者有功力不去膜則傷胃不祛心則作嘔

或用殼用仁用油生川炒用醋煑燒存性用研去

油名巴霜芫花為使畏大黃黃連涼水

或黑豆菜 得火良

豆汁亦作

此石醫

百

蘇詩
大非
時藥
疾

砒石端臥出於信州故者信石即錫之苗故錫亦

云有毒色白有黃紫者名金脚砒煉過者曰砒礬

色紅最劣性味辛苦而鹹大熱大毒煉砒礬時人

立上風十餘丈其下風所近草木皆死毒鼠鼠死

猶犬食亦死人服至一錢者立斃烟人家用少許

烈之性若酒服及燒酒服則腸胃腐爛傾刻殺人

雖菜豆冷水亦無解矣奈何以必死之藥治不死

之病惟腸咳牢固為哮喘為癆果因寒結不得已借

此酸苦涌泄吐之時珍日凡寒毒及解喘用此真

有劫病立起之效但須冷水吞

之不可以飲食同後靜臥一日或一夜亦不作吐
少物引吐即作吐也一婦病心痛數年不愈一醫
用人言半分茶葉一分白及殺蟲惡瘡砒石鈎綠
湯調下吐痰血一塊而愈及殺蟲惡瘡砒石鈎綠
上脂之其
效如神
枯痔外敷畏醋菜豆冷水半血

礪砂

礪砂 人係鹵液所結而成秉陰毒之氣含陽毒
之精其味苦鹹與辛其性大熱五金八石俱能消

磨 本草言能化硬肉難化入砂即爛故治暗瘡痰
功 其性猛烈始不堪言况人脆腸薄胃其堪用此

消導乎第或藥與病對有非峻迫投治不能奏效

不化

時珍曰：磁石九煎布毒之物，嗜屬反胃，按塊內癥
 之病，用之則有神功。蓋此疾皆起於七情飲食所
 致，痰氣滯結，遂成有形，妨碍道路。如穀食不消，則
 吐食痛脹，非此物化消，豈能去之？如穀食不消，則
 必用以麩、葶、魚、鱉，不消則必用以橘葉、紫蘇、生薑。
 菜、菓不消，則必用以丁香、桂心水飲。不消則必用
 以牽牛、芫花。至於肉食不消，又安能舍此阿魏、硫
 砂而不用乎？第當詳其虛實，審其輕重，緩急以求
 藥與病當。環、磁、石、占、六、實、中、有、積、攻、之、而、不、可、尋、死。
 初時果有人積攻之，自便者，屬虛人，縱有大積，或
 施及補兼施，可耳。如其虛虛不同，徒具實治，實屬
 衛見求。如其症不明，妄為投治，禍猶指掌，不可
 可法也。

本草綱目卷之五十五

不博出西戎如牙硝尤淨者良用水飛過醋煮乾
如霜刮下用之忌羊血

本草求真卷第八 第五册終